

Х.

Н. И. Каракашъ.

Остатки проблематическаго *Cephalites maximus*
Eichw.

N. I. Karakasch.

Les restes problematiques du *Cephalites maximus* Eichw.

Во время одной изъ моихъ экскурсій въ Крыму по долину р. Алмы, въ области развитія черныхъ юрскихъ сланцевъ, отличающихся чрезвычайной бѣдностью палеонтологическихъ остатковъ,—въ прослояхъ плотнаго, сѣраго, слюдистаго песчаника, залегающаго среди темныхъ глинистыхъ сланцевъ въ обнаженіяхъ по рѣчкѣ Каваршинъ, спускающейся отъ подножья Чатырдага и впадающей въ Алму, верстахъ въ десяти южнѣе дер. Бешуй,—мнѣ удалось найти въ двухъ пунктахъ оригинальные отпечатки въ видѣ сѣтки.

Петли этой сѣтки представляютъ довольно правильной формы шестиугольники отъ 12 до 14 мм. въ поперечникѣ, расположенные въ правильные ряды на ровной поверхности песчаника. Возвышающіяся на $1\frac{1}{2}$ —2 мм. надъ этой плоскостью округленные стѣнки петель достигаютъ 3—4 мм. толщины.

Найденные мною отпечатки имѣютъ отъ 70 до 100 мм. длиною и представляютъ, повидимому, только незначительную часть крупнаго отпечатка.

Они очень напоминаютъ собою рисунокъ описаннаго Эйхвальдомъ въ *Lethaea rossica* (t. II, p. 82, Pl. VII, f. 12) *Cepha-*

lites maximus, оригинала котораго, къ сожалѣнiю, не оказалось среди коллекци Эйхвальда въ Геологическомъ музеѣ Спб. Университета. Описанный имъ отпечатокъ, найденный также въ слюдистомъ юрскомъ песчаникѣ въ Крыму, между Ялтой и Алушкой, Эйхвальдъ считаетъ за остатокъ ископаемой губки и относитъ къ роду *Cephalites* съ нѣкоторымъ сомнѣнiемъ, въ виду незначительности имѣвшагося въ его распоряженiи обломка.

Микроскопическое изслѣдованiе нѣсколькихъ шлифовъ, приготовленныхъ изъ вышеназванныхъ петель, не обнаружило въ нихъ спикуль.

Въ виду схематичности рисунка Эйхвальда, на прилагаемой таблицѣ помѣщены фотографическiе снимки найденныхъ мною отпечатковъ.

Résumé.

Dans la seconde note l'auteur décrit deux fragments aplatis, élargis et garnis de mailles hexagonales très larges, formant de rangées transverses régulières. Ces fragments, trouvés dans un grès micacé jurassique dans un ravain nommé Kavarschin, affluent du fleuve Alma en Crimée, sont bien semblables au *Cephalites maximus* décrit et figuré par M-r Eichwald (*Lethaea rossica*, t. II, p. 82, Pl. VII, f. 12), qui a réuni ce spongiaire avec doute au genre *Cephalites*.

Объясненiе таблицы VIII (I).

Рис. 1—5. Членики *Isis spiralis* изъ Ак-каа въ Крыму.

Рис. 6 и 7. Членики *Isis spiralis* изъ Ак-Боты въ Уральск. обл.

Рис. 8 Копiя рисунка *Isis spiralis* Моррена.

Рис. 9. Копiя рисунка *Isis corallina* Моррена.

Рис. 10 — 11. Отпечатки *Cephalites maximus* Eichw. изъ юрскаго слюд. песчаника Крыма.

Explication de la planche VIII (I).

Fig. 1—5. Les segments d'*Isis spiralis* du crétacé du mont Ak-Kaïa en Crimée.

Fig. 6 et 7. Les segments d'*Isis spiralis* du calcaire glauconieux du mont Ak-Bota dans le gouv. d'Ouralsk.

Fig. 8. Une copie de la fig. d'*Isis spiralis* de M-r Morren.

Fig. 9. Une copie de la fig. d'*Isis corallina* de M-r Morren.

Fig. 10 — 11. Les empreints du *Cephalites maximus* Eichw. du grès micacé jurassique de la Crimée.

Н. И. ҚАРАҚАШЬ. I. Обь ископаемых изидинахъ.

II. Остатки проблем. *Cephalites maximus* Eichw.

Табл. VIII (1).

Taf. VIII (1).

Н. I. ҚАРАҚАШЬ. I. Les Isidines fossiles.

II. Les restes problematiques du *Cephalites maximus* Eichw.



1.



2.



3.



4.



8.



9.



5.




6.



7.



10



11

Труды Имп. С.П.Б. Общ. Ест. Т. XXXV. в. 5.
Trav. Soc. Imp. Nat. St. Pétersbourg. v. XXXV 1. 5.